

LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST



En péril

DESCRIPTION

- Corps élancé, tête étroite et museau pointu
- Tons de brun, certains individus sont verdâtres
- Peau granuleuse
- Trois rayures longitudinales sur son dos
- La lèvre supérieure est blanche
- Une bande noire traverse l'œil et se prolonge jusqu'à l'aine
- Les ventouses des doigts et des orteils sont petites
- Elle mesure maximum 3,7 cm !



Son chant est un **Criiii-ii-ii-ii-icc** sec et ascendant qui dure une seconde et se répète à intervalles réguliers.

Il rappelle le bruit d'un insecte et peut être comparé au bruit d'un ongle passant sur les dents d'un peigne.

REPRODUCTION

- Tôt au printemps - parfois quand la neige recouvre encore partiellement le sol
- La période de reproduction ne dure que 2 ou 3 semaines à un site donné, parfois moins longtemps
- L'espèce pond dans les champs et les clairières partiellement inondés à la fonte, dans les étangs peu profonds, les marécages, les fossés et les aulnaies inondées.

HABITAT

- Prés et milieux arbustifs relativement ouverts
- Friches, fourrés et les bois situés près des sites de reproduction

ALIMENTATION

- Petits invertébrés : fourmis, araignées, mouches...



Même lorsqu'elle chante, la rainette faux-grillon est très difficile à observer, car elle se tait au moindre mouvement suspect.



LA GRENOUILLE DES BOIS



Commune

DESCRIPTION

- Masque foncé
- Lèvre supérieure blanche
- Son corps peut être brun, beige, gris, rosé ou orangé
- Le mâle est plus petit que la femelle. En période de reproduction, il présente des excroissances cornées sur les pouces, et est parfois presque noir
- La femelle devient rougeâtre ou orangée en période de reproduction
- Taille moyenne - pas plus de 8 cm de long
- La grenouille des bois n'est jamais verte !



Son chant ressemble **au cri du canard**

REPRODUCTION

- Se reproduit dans des étangs forestiers temporaires dès les premiers jours du printemps, soit début d'avril dans le sud du Québec.
- Peut pondre entre 600 et 3000 oeufs

HABITAT

- Habite principalement les forêts, qu'elles soient feuillues, mixtes ou conifériennes.
- Elle hiberne en milieu terrestre, sous des roches ou des troncs, ou bien enfouie dans la litière forestière.

ALIMENTATION

- Se nourrit d'une grande variété d'insectes et autres invertébrés : araignées, limaces, vers, escargots



La grenouille des bois est active le jour comme la nuit. Sa coloration lui procure un excellent camouflage qui la rend pratiquement invisible sur un sol de feuilles mortes.



LA RAINETTE CRUCIFÈRE



Commune

DESCRIPTION

- Marque foncée sur le dos en forme de « X »
- Son corps va du beige au brun; certains individus sont rougeâtres ou jaunâtres
- Un masque foncé couvre les côtés de la tête
- La taille maximale de l'espèce est de 3,7 cm
- Le mâle est plus petit que la femelle. Sa gorge est lisse foncée ou jaunâtre en période de reproduction
- La femelle est plus pâle que le mâle et parfois orangée, en période de reproduction. Sa gorge est de même couleur et de même texture que le ventre

REPRODUCTION

- Commence à chanter dès les premières nuits chaudes d'avril, lorsque le sol forestier commence à dégeler.
- La taille des chorales augmente à chaque période de chaleur, jusqu'à début de mai.
- Nombre d'œufs : 200 à 1600 (paquets de 1 à 40)



Son chant est constitué d'une **série de « peep »** espacés d'environ une seconde chacun, Il devient assourdissant lorsqu'elles sont nombreuses.

HABITAT

- Fréquente les forêts, les friches, les étangs à quenouilles, les marécages et les tourbières.
- Elle hiberne dans la litière forestière ou abritée sous un tronc pourri ou des écorces tombées au sol.

ALIMENTATION

- Se nourrit de petits invertébrés comme les acariens, les moucheron et les fourmis



La rainette crucifère est l'un des amphibiens les plus communs du Québec et des Maritimes. Elle est principalement active de nuit, demeurant bien à l'abri durant le jour.



LA GRENOUILLE LÉOPARD



Commune

DESCRIPTION

- Taches foncées ovales sur son corps, en nombre variable et disposées de façon plus ou moins ordonnée
- Les taches ont habituellement une bordure pâle.
- Corps vert ou brun, rarement gris, certains spécimens présentant un mélange de ces couleurs.
- Mesure au plus 11 cm.
- Le mâle présente des excroissances cornées sur ses pouces en période de reproduction.
- La femelle est plus grosse que le mâle.

REPRODUCTION

- L'accouplement est assez hâtif, soit dès les premiers jours d'avril dans le sud, jusqu'au début juin dans le nord.
- Va pondre entre 900 à 5200 œufs



Son chant ressemble à un **petit rire bourru**, d'une durée de deux à cinq secondes, et comprend souvent des grognements résonnants

HABITAT

- Fréquente principalement les habitats ouverts : marais bordant les lacs et les rivières, étangs, tourbières, champs.
- Hiberne au fond de l'eau dans les lacs, les rivières et les étangs, souvent là où il y a du courant.

ALIMENTATION

- Consomme une grande variété d'insectes et divers autres invertébrés terrestres : limaces, vers, escargots, araignées.
- Les gros individus s'en prennent parfois aux petites grenouilles.



La grenouille léopard est principalement active le jour



LE CRAPAUD D'AMÉRIQUE



Commun

DESCRIPTION

- Teintes très variable, habituellement brun ou beige, mais peut être aussi jaune, rougeâtre, verdâtre ou noir
- Tête courte et large, museau arrondi
- Trapu et ses pattes postérieures sont relativement courtes
- Taille maximale de 11,5 cm
- Le mâle est plus petit que la femelle, il a la gorge foncée. Des excroissances cornées apparaissent sur le dessus du pouce et du second doigt en période de reproduction
- La femelle devient rougeâtre en période de reproduction
- Certains jeunes crapauds sont entièrement rougeâtres ou orangés

REPRODUCTION

- La période survient dès la fin d'avril dans le sud du Québec.



Son chant s'apparente à un **trille prolongé** et peut se faire entendre de jour comme de nuit.

HABITAT

- Habite divers habitats terrestres : forêts, friches, tourbières et même les jardins de banlieue.
- Il arrive que les crapauds visitent les maisons de campagne la nuit, à cause des insectes attirés par la lumière qui sont pour eux une bonne source de nourriture.

ALIMENTATION

- Se nourrit de petits invertébrés terrestres très variés.
- Très rarement, il mangera un crapaud beaucoup plus petit.



Le crapaud d'Amérique est actif autant de jour que de nuit. Ces crapauds aux couleurs très contrastées se camouflent bien sur un sol de roches et de lichens, caractéristique importante compte tenu de leur activité diurne prolongée aux hautes latitudes où les nuits sont courtes.



LA GRENOUILLE DES MARAIS



à statut

DESCRIPTION

- Possède deux rangées de taches rectangulaires foncées sur le dos, entre les plis dorsaux-latéraux et une rangée de ces taches rectangulaires sur chaque flanc
- Son corps est brun ou cuivré
- La face interne des cuisses est de couleur jaune ou orange
- Peut atteindre plus de 8cm de long !
- Les taches ont parfois une teinte de vert



Son chant ressemble à un **ronflement rude**, d'environ une seconde. Comme il chante souvent sous l'eau, la portée de son chant peut être réduite.

REPRODUCTION

- En période de reproduction, des excroissances cornées apparaissent sur les pouces du mâle
- L'accouplement a lieu dès avril.
- Nombre d'œufs 780 à 3000

HABITAT

- L'espèce est surtout terrestre durant l'été, mais se tient souvent près de l'eau
- Généralement associée aux terrains montagneux
- Elle hiberne dans les étangs et les ruisseaux

ALIMENTATION

- Se nourrit de petits invertébrés, insectes et araignées, qu'elle pourchasse en bordure des eaux et dans les habitats terrestres.



Pareil, pas pareil !

La grenouille des marais peut être confondue avec la grenouille léopard.

Deux clés pour les différencier

- La **couleur**
 - La grenouille léopard est **verte**
 - La grenouille des marais est **brune**
- La forme des **taches**
 - Rond / ovale : grenouille léopard
 - Rectangulaire : grenouille des marais



Grenouille des marais



Grenouille léopard

© Gilles Arbour



LA RAINETTE VERSICOLORE



Commune

DESCRIPTION

- Peau granuleuse ; rappelle l'écorce d'un arbre
- Ventouses développées
- Coloration varie du vert au gris en passant par le brun
- Taches irrégulières foncées sur le dos
- L'intérieur de cuisses est jaune vif ou orangé
- Peut atteindre 6cm de long
- Le mâle est généralement plus petit que la femelle.



Le chant de la rainette versicolore s'apparente à une **série de trilles d'environ 1 seconde**. Rappelle la sonnerie d'un téléphone.

REPRODUCTION

- L'accouplement a lieu à la fin du printemps et au début de l'été (mai et juin)
- Le jour, elles restent dans les arbres autour de l'étang de reproduction
- Peut pondre jusqu'à 2000 oeufs

HABITAT

- La rainette versicolore est arboricole
- Fréquente les zones boisées avec des plans d'eau permanents

ALIMENTATION

- Se nourrit d'insectes et de petits invertébrés dans les arbres ou au sol



Un individu peut changer de couleur en quelques minutes ! Son corps varie du vert au gris, en passant par le brun, c'est notre caméléon du Québec !



© Marie-Pier Richard



© Jacques Bardier



LA GRENOUILLE VERTE



DESCRIPTION

Commune

- Coloration verte ou brune ou une combinaison des deux couleurs
- Elle a toujours les lèvres supérieures, et généralement la tête, verte
- Les membres postérieurs sont ornés de stries noires transversales
- Possède une grosse cavité tympanique distincte et des crêtes dorsaux-latérales proéminentes
- Peut atteindre jusqu'à 11cm de long !
- Les taches ont parfois une teinte de vert

REPRODUCTION

- Le mâle commence à chanter vers la mi-juin
- Nombre d'œufs 1400 à 5300



Son chant est constitué d'un "tung" qui rappelle étrangement le son grave d'une corde de banjo

HABITAT

- La grenouille verte est aquatique
- Elle fréquente les eaux permanentes : lacs, étangs, tourbières, rivières et marais
- L'hibernation a lieu au fond de l'eau

ALIMENTATION

- L'essentiel de son alimentation consiste en divers insectes et autres invertébrés. Lorsque l'occasion se présente, les gros individus dévorent parfois de petites grenouilles, de petites couleuvres et des écrevisses.
- La grenouille verte est principalement diurne et chasse à l'affût, se contentant d'attendre que ses proies se présentent devant elle pour s'en saisir.




Pareil, pas pareil !

La grenouille verte peut être confondue avec le ouaouaron. Une clé pour les différencier :

Regardez la **ligne dorsale** !

Les ouaouarons n'en possèdent pas contrairement à la grenouille verte

Plis dorsaux-latéraux



Grenouille verte



Ouaouaron

© Carl D. Howe, iNaturalist 2024



LA GRENOUILLE DU NORD



Commune

DESCRIPTION

- Coloration verdâtre ou brunâtre
- Mouchetures foncées disposées de façon irrégulière
- Plis dorsaux-latéraux absents ou peu prononcés
- Taches oblongues présentes sur les pattes arrière, dans le sens de la longueur
- La lèvre supérieure est verte
- N'excède guère 7,5 cm

REPRODUCTION

- La reproduction se déroule de juin à août
- Les étangs, les lacs, les tourbières et les laisses de méandres peuvent servir à la ponte



Son chant est constitué d'une série de gloussements sourds "**toc, toc, toc**" et peut être comparé à un martèlement lointain ou une poule qui caquette

HABITAT

- Très aquatique, la grenouille du Nord quitte rarement l'eau
- Elle fréquente divers habitats où l'eau est permanente, comme les lacs, les étangs à castor et les tourbières
- On l'observe souvent là où il y a des nénuphars, dans les lacs clairs aux rives arbustives

ALIMENTATION

- Une grande proportion de la diète de cette espèce est composée d'insectes aquatiques : gyrins, patineurs d'eau, demoiselles, libellules, etc.



La grenouille du Nord est active jour et nuit. Elle est très nerveuse et plonge habituellement à l'eau dès qu'on l'approche.



OUAOUARON



DESCRIPTION

Commun

- Sa coloration va du vert au brun
- Son dos est parfois moucheté de taches foncées diffuses
- Peut atteindre 20 cm de long, mais la majorité des individus mesure entre 12 et 16 cm
- Le tympan du mâle est plus grand que son œil; sa gorge est jaune
- Le tympan de la femelle est à peu près du diamètre de l'œil; sa gorge blanche ou grise
- À la métamorphose, l'individu présente de nombreux points noirs, comme le têtard

REPRODUCTION

- Le mâle chante presque toutes les nuits en juin et en juillet
- Nombre d'œufs 3800 à 23 500



Son chant puissant et grave ressemble un peu au **beuglement d'une vache** et semble dire le mot « Ouaouaron ».

HABITAT

- Le ouaouaron est **aquatique** et peut habiter la plupart des milieux aquatiques permanents : lacs, baies et bras morts de rivières, étangs, marais.
- Il hiberne au fond de l'eau dans un plan d'eau permanent

ALIMENTATION

- Très vorace, le Ouaouaron mange littéralement tout ce qu'il peut capturer et avaler : insectes et autres invertébrés et même des grenouilles de plus petite taille, des poissons, des jeunes couleuvres, des souris ou des petits oiseaux !



C'est le plus gros anoure d'Amérique du Nord, il pèse en moyenne 200 g à l'âge adulte !

